

Ingesta de micronutrientes en pacientes con epilepsia refractaria tratados con dieta cetogénica

Micronutrients intake in patients with refractory epilepsy with ketogenic diet treatment

Tabla Suplementaria 1. Correlación entre el aporte de energía con el porcentaje de adecuación de consumo según tipo de dieta cetogénica

Variable	Dieta Clásica (n = 9)		DMA (n = 10)	
	p	Valor p	p	Valor p
Vitamina A	-0,03	0,94	-0,44	0,2
Vitamina C	0,08	0,98	-0,26	0,5
Vitamina D	-0,126	0,74	0,43	0,2
Vitamina E	0,73	0,03*	-0,2	0,58
Vitamina K	-0,73	0,03*	-0,28	0,43
Vitamina B1	-0,35	0,35	-0,7	0,03*
Vitamina B2	-0,26	0,49	-0,66	0,04*
Niacina	-0,56	0,11	-0,64	0,046*
Vitamina B6	-0,35	0,35	-0,79	0,006*
Vitamina B12	-0,4	0,28	-0,61	0,06
Ácido Fólico	-0,74	0,02*	-0,84	0,003*
Ácido Pantoténico	-0,41	0,27	-0,69	0,026*
Sodio	0,1	0,78	-0,323	0,36
Potasio	-0,64	0,06	-0,51	0,14
Calcio	-0,66	0,051	-0,1	0,76
Fósforo	-0,076	0,84	0,0	1,0
Hierro	-0,19	0,61	-0,49	0,15
Zinc	-0,24	0,54	-0,46	0,18
Selenio	-0,29	0,46	-0,5	0,13
Magnesio	-0,35	0,35	-0,8	0,006*
Cobre	-0,38	0,3	-0,72	0,02*